

# Calendário de Vacinação do ADULTO e do IDOSO

Recomendações da Associação Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2010

VACINAS	ESQUEMAS	COMENTÁRIOS	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS		
			postos públicos de vacinação	clínicas privadas de imunização	
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Uma ou duas doses (com intervalo mínimo de 30 dias) para homens e mulheres até 49 anos, de acordo com histórico vacinal, de forma que todos recebam no mínimo duas doses na vida. Dose única para homens e mulheres com mais de 49 anos.	Contraindicada para imunodeprimidos e gestantes.	SIM	SIM	
Hepatites A, B ou A e B	<b>Hepatite A:</b> duas doses, com intervalo de seis meses após a primeira (esquema 0-6 meses).	<ul style="list-style-type: none"> <li>A vacinação combinada contra as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada contra as hepatites A e B.</li> <li>Esquemas especiais de vacinação contra a hepatite B:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) para imunodeprimidos e renais crônicos: dose dobrada (2 mL = 40 mcg) em quatro aplicações (esquema 0-1-2-7 meses);</li> <li>b) para imunocompetentes com alto risco de exposição: dose normal (1 mL = 20 mcg), em quatro aplicações (esquema 0-1-2-7 meses) com intervalos de um mês entre a primeira e a segunda, e a segunda e a terceira, e de seis meses entre a terceira e a quarta.</li> </ul> </li> </ul>	NÃO	SIM	
	<b>Hepatite B:</b> três doses – a segunda um mês depois da primeira e a terceira seis meses após a primeira (esquema 0-1-6 meses).		a) para imunodeprimidos e renais crônicos: dose dobrada (2 mL = 40 mcg) em quatro aplicações (esquema 0-1-2-7 meses); b) para imunocompetentes com alto risco de exposição: dose normal (1 mL = 20 mcg), em quatro aplicações (esquema 0-1-2-7 meses) com intervalos de um mês entre a primeira e a segunda, e a segunda e a terceira, e de seis meses entre a terceira e a quarta.	SIM, até 19 anos*	SIM
	<b>Hepatite A e B:</b> três doses – a segunda um mês depois da primeira e a terceira seis meses após a primeira (esquema 0-1-6 meses). A vacinação combinada contra as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada contra as hepatites A e B.			NÃO	SIM
HPV	Para mulheres na prevenção da infecção por papilomavírus humano: de nove a 26 anos em três doses, no esquema 0-2-6 meses com a vacina do laboratório MSD ou de dez a 25 anos em três doses, no esquema 0-1-6 meses com a vacina do laboratório GSK.	A princípio, somente as adolescentes do sexo feminino com mais de nove anos e mulheres até 26 anos deverão ser vacinadas. Sempre que possível, a vacina anti-HPV deve ser aplicada preferencialmente na adolescência, antes de iniciada a vida sexual, entre 11 e 12 anos de idade.	NÃO	SIM	
Vacinas contra difteria, tétano e coqueluche	<b>Com esquema de vacinação básico completo:</b> reforço com dTpa (tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) e após, uma dose de dT a cada dez anos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>O uso da vacina dTpa está especialmente indicado para adultos que convivem ou cuidam de lactentes menores de um ano, visto serem um dos principais transmissores da <i>Bordetella pertussis</i> para esse grupo.</li> <li>Deve-se considerar fortemente a indicação da vacina dTpa para idosos.</li> <li>Uma dose de vacina dTpa é recomendada, mesmo nos indivíduos que receberam a vacina dupla bacteriana do tipo adulto (dT) há dois ou mais anos.</li> </ul>	dT SIM	dT SIM	
	<b>Com esquema de vacinação básico incompleto ou desconhecido</b> (com menos de três doses anteriores de vacina dT, DTP ou DTPa): completar o esquema de três doses, aplicando uma dose de dTpa (tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) e uma ou duas doses de dT (dupla bacteriana do tipo adulto) (esquema 0-2-6 meses).			dTpa NÃO	dTpa SIM
Varicela (catapora)	A partir dos 13 anos de idade: duas doses, com intervalo de dois meses.	Indicada apenas para adultos sem história anterior de varicela. Contraindicada para imunodeprimidos e gestantes.	NÃO	SIM	
Influenza (gripe)	Dose única anual.	–	SIM, para grupos de risco	SIM	
Pneumocócica 23-valente	Dose única.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recomendada para maiores de 60 anos de idade e pessoas com doenças crônicas (cardiopatas, pneumopatas, diabéticos asplênicos etc.) e outras condições consideradas de risco para a doença pneumocócica.</li> </ul>	SIM, para grupos de risco**	SIM	
Meningocócica C conjugada	Dose única.	Ainda que baixa a incidência da doença meningocócica em pacientes adultos, recomenda-se a vacinação, quando possível ou em casos de surtos.	NÃO	SIM	
Febre amarela	Uma dose a cada dez anos, para quem vive ou vai se deslocar para áreas endêmicas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicada para habitantes de áreas endêmicas de febre amarela e para as pessoas que vão viajar ou se mudar para essas regiões, assim como para atender exigências sanitárias de determinadas viagens internacionais.</li> <li>Vacina contraindicada para imunodeprimidos e gestantes, exceto quando os riscos de adquirir a doença superam os riscos potenciais da vacinação.</li> <li>Vacinar pelo menos dez dias antes da viagem.</li> </ul>	SIM	SIM	

\* Nos estados da região Norte, a vacina contra hepatite B está disponível para pessoas de até 39 anos de idade.

\*\* A vacina contra pneumococo é aplicada durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, nos indivíduos que convivem em instituições fechadas, tais como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso, com apenas um reforço cinco anos após a dose inicial.